



7°48' dessinée par A. Maurer

Echelle : 1/25 000



Fond topographique d'après minutes I.G.N.
1/50 000 - MAN NB 29 XXIII (Mtes 1 et 6)

Equidistance des courbes 20m

CARTE GÉOMORPHOLOGIQUE : RÉGION DU RANCH DE SIPILOU

I UNITÉS MORPHOGÉNÉTIQUES	II FORMATIONS SUPERFICIELLES	III CORRESPONDANCE AVEC LES FORMATIONS VÉGÉTALES
HAUT-GLACIS	-Sub en place Cuirasse affleurante; couverture argileuse peu épaisse ou absente. Localement rebord cuirassé escarpé.	Savane herbeuse
	-Remanié Cuirasse démantelée; matériel argilo-gravillonnaire localement recimenté	Savane herbeuse ou faiblement arbustive. Forêt semi-décidue sur matériel argileux plus épais
	-Démantelé Formation argilo-gravillonnaire issue d'une cuirasse entièrement démantelée	Forêt semi-décidue. Savane arborée à boisée
MOYEN-GLACIS (Moyen-versant)	Epanchage sablo-gravillonnaire localement induré	Savane arborée

I	II	III
BAS-VERSANT	Sables d'épandage colluvial. Localement matériel plus hétérométrique (décapage par reprise d'érosion)	Savane faiblement arbustive
ENTAILLES SUB-ACTUELLES ET ACTUELLES	Basse-terrasse de la Méné. Formation argilo-sableuse	Savane herbeuse
	Têtes de vallon à très forte entaille en V dans l'altération, passant vers l'aval à des fonds plats sableux évases	Forêt semi-décidue Forêt semi-décidue ou savane herbeuse
Matériel hétérométrique de versant polygénique (talus sous rebord cuirassé, collines de roches basiques)		Savane boisée

- Piste
- Réseau hydrographique
- Escarpement
- Forêt

OFFICE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET
TECHNIQUE OUTRE-MER
JM AVENARD 1976

UNIVERSITE LOUIS PASTEUR STRASBOURG
CENTRE DE GEOGRAPHIE APPLIQUEE