RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ORSTOM

INSTITUT FRANÇAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT EN COOPÉRATION

# CARTE ARCHÉOLOGIQUE DU CAMEROUN

# MAROUA

**Implantation et groupements sols-végétation par A. MARLIAC et J. BARBERY**







NC-33-X: matricule de référence correspondant au découpage international.
*reference symbol corresponding to the sheet line international system.*

FOND TOPOGRAPHIQUE DE L'I.G.N. A 1/200 000
FEUILLE NC. 33. XV. MAROUA Edition 1973

## LÉGENDE

La numérotation des sites renvoie au catalogue général et à l'Atlas du Cameroun Septentrional (ORSTOM).

| UNITÉS FOTIUS (*) | UNITÉS SOLS | | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|
| R0 R11 R2 R3 R32 R33 R51 R5 R7 | ensembles | R | rochers, arènes des massifs, inselberg: à groupements végétaux ± dégradés |
| 93 95 | montagnards | RJ | groupements à Isoberlinia doka (650-950 m d'altitude) |
| 511 512 | montagnards | RB | groupement à Boswellia dalzieli sur plateaux ou piémonts |
| 22 26 28 | secteurs de bas-fonds | F | groupements à épineux ou Mytragina inermis en forêts galeries |
| 64 641 +31 | + mares temporaires | E | vallées évasées parfois cultivées |
| | secteurs | $H_1$ | à Balanites et Lannea humilis |
| | des hardés | $H_2$ | plus perméable et/ou plus sableux (acacia ou anogeissus) |
| 352 361 371 372 373. 374 381 382 | secteurs à texture | Y | Yaeres (le plus souvent argileux et inondés) |
| 14 | lourde | T | groupements à Tamarindus indica |
| 391 392 393 394 395 | ± vertiques | P | groupements à Piliostigma reticulata |
| 13 134 136 137 321 34 341 167 181 183 | vertisols ou sols argileux | S | groupements à Acacia seyal |
| 130 135 138 | forte dégradation | SD | groupements à Acacia seyal |
| 131 133 | jachères | SJ | groupements à Acacia seyal |
| 45 46 | secteurs des jachères | JK | argiles Karal |
| 41 411 412 414 42 | nettes | JS | sableux |
| 413 421 422 43 431 432 451 452 453 461 47 471 472 474 | | JN | à texture variable |
| 40 401 | | JD | village ou auréole de dégradation |
| 54 541 | secteurs de jachères à groupements | PJ | à Piliostigma thonningii — texture variable |
| 673 675 | | AJ | à Anogeissus leiocarpus — texture variable |
| 522 | | TJ | à Terminalia laxiflora |
| 71 711 75 | | GJ | à Guiera senegalensis — texture sableuse |
| 721 73 | | CJ | à Sclerocarya birrea |
| 17 171 173 175 | groupements homogènes | GB | à Balanites argyptiaca |
| 174 | | GBS | à Balanites argyptiaca (sables) |
| 161 162 164 165 166 | | GA | à Acacia hockii |
| 621 63 631 632 634 65 653 654 | | GN | à Anogeissus leiocarpus |
| 61 62 | | GNS | à Anogeissus leiocarpus (sables) |
| 72 | sables dunaires | GS | à Sclerocarya birrea |
| 842 843 845 846 847 848 849 850 | formations anthropiques | A | texture variable |
| 841 844 | à acacia albida | AS | texture sableuse |

(*) Carte phytogéographique du Cameroun Septentrional par **B. FOTIUS**, botaniste à l'**ORSTOM**, feuille Maroua 1/200 000 (non publiée).

### SYMBOLES DES SITES

| | Sites sans précision | Sites fouillés |
|---|---|---|
| Paléolithique | ▽ | ▼ |
| Néolithique | × | ⊠ |
| Incertain | • | |
| Age du fer | ▽ | ▼ |
| Famille 1 | Ⓥ | Ⓥ |
| Famille 2 | ▽ | ▼ |
| Age du fer récent | △ | |
| Site composite | * | |

ÉCHELLE 1/200 000

0 5 10 15 20 km


Prospection de A. MARLIAC (ORSTOM), J. BARBERY (ORSTOM), M. DELNEUF (ORSTOM), M. LAMOTTE (ORSTOM) et O. LANGLOIS (ORSTOM) et pour partie, N. DAVID (University of Calgary, Canada).

UNITÉ DE CARTOGRAPHIE DE L'ORSTOM



© ORSTOM 1992



Cartographie réalisée par A. MAUGENS
Système Graphique Cartographique - Paris.

Impression Impact Graphic S.A. - France -

01369