




ÎLES PROSPECTÉES



LES MIGRATIONS DU COUCOU DE NOUVELLE-ZÉLANDE
(*Urodynamis taitensis*, 'āreareva)



Nicheur en Nouvelle-Zélande, il entreprend durant l'hiver austral une migration en Mélanésie, Micronésie et Polynésie. En Polynésie, ce coucou est un visiteur régulier dans la plupart des îles à l'exception des îles Marquises où il est occasionnel


- Origine
- Présence régulière
- Présence occasionnelle

DISTRIBUTION DES FAUVETTES À LONG BEC EN POLYNÉSIE




LA COLONISATION DU ZOSTEROPS À POITRINE GRISE (*Zosterops lateralis*)

Introduit à Tahiti vers 1937, il a colonisé les îles hautes de la Société et plus récemment les îles d'archipels voisins




RÉPARTITION DU BULBUL CUL-ROUGE (*Pycnonotus caffer*)

En 1989 sur l'île de Tahiti où il a été observé pour la première fois en 1979



RÉPARTITION DE LA FAUVETTE À LONG BEC (*Acrocephalus caffer*, 'ōtātare) À TAHITI



PROGRESSION DE LA TOURTERELLE STRIÉE (*Geopelia striata*). Elle occupe les régions littorales et les vallées défrichées de l'intérieur à basse altitude

