INSTITUT DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE DE MADAGASCAR ET
BUREAU DE CONSERVATION DES SOLS

CARTE D'UTILISATION DES SOLS – MAROVOAY FEUILLE N° 5

(D'après photographie aérienne du S.G.M.)

ECHELLE AU 1/20.000e

Carte dressée par MM. BOSSER et HERVIEU
Campagne 1955

Ahibary
Anosifisaka
Ambolompoty
Anosikapika
Bepako
Antranodaka
Madirokely
St on Agricole
Ambanjabe
Betaramahamay

LEGENDE

CLASSE DE SOL

- II A — Rizière : Sol de bonne fertilité, facile à aménager
- III B — Culture : Sol peu fertile, travaux anti-érosifs courants
- V — Culture fruitière
- VI B — Pâturage médiocre à regénérer
- VII B — Végétation naturelle ou réembroussaillement

VEGETATION

- Terres cultivées (riz)
- Cultures sporadiques (riz) sur groupement halophile à Cyperus volodioides Cherm.
- Cultures sporadiques (riz) sur bas fond à végétation complexe (Phragmites mauritianus Kunth, Mimosa asperata L., Cyperus volodioides Cherm.)
- Cultures sèches, jachère à Cynodon dactylon Pers.
- Groupement halophile à Cressa cretica L. et Cyperus volodioides Cherm.
- Prairie marécageuse à Pycreus Mundtii Nees
- Végétation complexe de bas fond (Phragmites mauritianus Kunth, Mimosa asperata L., Cyperus volodioides Cherm.)
- Pseudosteppe à Hyparrhenia Ruprechtii Fourn., Hyparrhenia rufa Stapf., Heteropogon contortus P.B.
- Végétation arborée des abords de villages (Manguiers, Rotra (Eugenia jambolana L.) Bananiers)
- Savane à Hyphaene shatan Boj. et Heteropogon contortus P.B.
- Savane à Zizyphus jujuba Lamk. et Heteropogon contortus P.B.
- Savane à Poupartia caffra (Sond) Perr. et Heteropogon contortus P.B.
- Savane à Tamarindus indica L., Poupartia caffra Perr., Dalbergia trichocarpa Bak.
- Vestiges de forêt tropophile sur terres hautes

02523

Reproduction S.G.M. 1956

Dessiné par P. Raoilinjatovo

6-57