



LEGENDE

CLASSES DE SOL

- I A Bons sols de culture, pas de travaux anti-érosifs, déjà mis en valeur ou mis en valeur facile
- II A Sols fertiles, donnant de bonnes rizières, déjà aménagés, ou nécessitant peu de travaux d'aménagement
- II B Sols pouvant donner de bonnes rizières, mais travaux d'aménagement importants ou rizières de valeur moyenne
- II C Sols pouvant donner des rizières de valeur moyenne, mais travaux d'aménagement importants ou rizières aménagées de médiocre valeur
- III A Sols de cultures sèches de bonne fertilité; travaux anti-érosifs courants nécessaires. Maintien de la fertilité par utilisation régulière de fumures, assolements, plantes de couverture, prairie temporaire
- III B Sols de cultures sèches de fertilité médiocre. Nécessitant les mêmes traitements que les précédents ou sols de valeur moyenne mais travaux d'aménagement importants
- VI A Pâturage de bonne valeur à l'état naturel; bonne couverture du sol par des graminées bonnes fourragères
- VI B Pâturage médiocre; couvert végétal dégradé, graminées fourragères de valeur moyenne à médiocre
- VII A Sols ne convenant ni à la culture, ni au pâturage, portant déjà des forêts ou des reboisements exploitables, ou pouvant être économiquement reboisés
- VII B Sols ne convenant ni à la culture, ni au pâturage, de peu d'intérêt pour le reboisement, à laisser se ré-embroussailler naturellement

VEGETATION

- + + Terres sous cultures
- + 0 Rizières avec jachères à *Cynodon dactylon* Pers.
- + + Cultures sèches (manioc, arachide), jachères à *Cynodon dactylon* Pers.
- + + Cultures (rizières ou cultures vivrières sur bas de pente), jachères à *Digitaria Humberti* A. Camus
- + + Cultures, jachères à *Digitaria Humberti* A. Camus et *Cynodon dactylon* Pers.
- + + Cultures (rizières), jachères à *Leersia hexandra* Sw.
- + 0 Cultures sèches, jachères à *Imperata Cylindrica* Beauv.
- ≡ ≡ Marais à *Cyperus madagascariensis* Roem. et Schult. (Zozoro)
- ≡ ≡ Marais à *Cyperus latifolius* Poir. (Herana)
- ⬢ ⬢ Prairie à *Digitaria Humberti* A. Camus
- ⬢ ⬢ Prairie marécageuse à *Cyperus latifolius* Poir. et *Digitaria Humberti* A. Camus
- ⬢ ⬢ Prairie marécageuse à *Cyperus latifolius* Poir. et *Leersia hexandra* Sw.
- ⬢ ⬢ Prairie marécageuse à *Digitaria Humberti* A. Camus et *Leersia hexandra* Sw.
- ⬢ ⬢ Prairie marécageuse à *Aristida similis* Steud. et *Digitaria Humberti* A. Camus
- v v Pseudosteppe à *Aristida multicaulis* Bak.
- v v Pseudosteppe à *Aristida multicaulis* Bak. et *Hyparrhenia rufa* Stapf
- v v Pseudosteppe à *Aristida multicaulis* Bak. et *Pteridium aquilinum* Kunth.
- ▨ Reboisement en Eucalyptus
- □ Plantation de fruitiers aux abords de villages
- ⬢ ⬢ Vestige de boisement secondaire en bordure de bas fond (*Haronga madagascariensis* Choisy, *Solanum auriculatum* Ait., *Trema orientalis* Bl.)
- ⬢ ⬢ Vestige de forêt marécageuse de bas fond