



LEGENDE

CLASSES DE SOL

- I A Dans sols de culture, pas de travaux antérieurs, déjà mis en valeur ou mise en valeur facile
- I B Sols de valeur moyenne, pas de travaux antérieurs, mais demandant des fumures plus fortes ou bons sels, mais mis en valeur demandant plus de travaux
- I C Sols une fois aménagés, demandant peu de travaux antérieurs, mais potentiel de fertilité bas; fortes fumures ou sels de valeur moyenne nécessitant des travaux importants d'aménagement
- II A Sols fertiles, donnant de bonnes rizières, déjà aménagés ou nécessitant peu de travaux d'aménagement
- II B Sols pouvant donner de bonnes rizières, mais travaux d'aménagements importants ou rizières de valeur moyenne
- II C Sols pouvant donner des rizières de valeur moyenne, mais travaux d'aménagement importants, ou rizières aménagées de médiocre valeur
- III B Sols de cultures sèches de fertilité médiocre. Nécessitant les mêmes traitements que les précédents ou sols de valeur moyenne, mais travaux d'aménagement importants
- V Sols ne pouvant être cultivés "peu trop forte" mais pouvant porter des cultures arborescentes (fruitiers)
- YIA Pâturage de bonne valeur à l'état naturel, bonne couverture du sol par des graminées, bonnes fourragères
- YIB Pâturage médiocre; couvert végétal dégradé, graminées fourragères de valeur moyenne à médiocre
- YIIA Sols ne convenant ni à la culture, ni au pâturage, portant déjà des forêts ou des reboisements exploitables, ou pouvant être économiquement reboisés
- YIIB Sols ne convenant ni à la culture, ni au pâturage de peu d'intérêt pour le reboisement à laisser se réaménager naturellement.

VEGETATION

- Terres sous cultures
- Rizières avec jachères à *Cynodon dactylon* Pers
- Cultures sèches (maïs, arachide) jachères à *Cynodon dactylon* Pers
- Cultures (rizières ou cultures vivrières sur bas de pente), jachères à *Digitaria Humberti* A. Camus
- Cultures jachères à *Digitaria Humberti* A. Camus et *Cynodon dactylon* Pers
- Cultures (rizières), jachères à *Leersia hexandra* Sw.
- Marais à *Cyperus madagascariensis* Roem. et Schult (zozoro)
- Marais à *Cyperus latifolius* Poir (Herana)
- Prairie marécageuse à *Leersia hexandra* Sw. (Tsiriry)
- Prairie marécageuse à *Andropogon trichozygus* Dak
- Prairie à *Digitaria Humberti* A. Camus
- Prairie marécageuse à *Cyperus latifolius* Poir. et *Digitaria Humberti* A. Camus
- Prairie marécageuse à *Cyperus latifolius* Poir. et *Leersia hexandra* Sw
- Prairie marécageuse à *Digitaria Humberti* A. Camus et *Leersia hexandra* Sw
- Prairie marécageuse à *Aristida similis* Steud. et *Digitaria Humberti* A. Camus
- Prairie marécageuse à *Trichopteryx dregeana* Nees
- Peuplement de *Typhonodorum Lindleyanum* Schott. (Viha)
- Végétation postculturale à *Cynodon dactylon* Pers. et *Digitaria Humberti* A. Camus
- Végétation postculturale à *Aristida multicaulis* Bak. et *Cynodon dactylon* Pers
- Pseudosteppe à *Aristida multicaulis* Bak
- Pseudosteppe à *Aristida multicaulis* Bak. et *Hyparrhenia rufa* Stapf.
- Pseudosteppe à *Aristida multicaulis* Bak. et *Pteridium aquilinum* Kunth.
- Reboisement en *Eucalyptus*
- Plantation de fruitiers aux abords de villages
- Peuplement de *Raphia Ruffia* Mart.
- Vestige de boisement secondaire en bordure de bas fond (*Herana madagascariensis* Choisy, *Solanum auriculatum* Ait., *Trema orientalis* Bl)