INSTITUT DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE DE MADAGASCAR ET
BUREAU DE CONSERVATION DES SOLS

CARTE D'UTILISATION DES SOLS - AMBOHIJANAHARY - FEUILLE N°2

(D'après photographie aérienne du S.G.M.)

ECHELLE AU 1/20.000e

Carte dressée par MM. BOSSER et RIQUIER
Campagne 1954-55



LEGENDE

CLASSES DE SOL

- IA — Bons sols de culture, pas de travaux anti-érosifs, déjà mis en valeur ou mise en valeur facile
- IB — Sols de valeur moyenne, pas de travaux anti-érosifs, mais demandant des fumures plus fortes ou bons sols, mais mise en valeur demandant plus de travaux
- IC — Sols une fois amenagés demandant peu de travaux anti-érosifs, mais potentiel de fertilité bas; fortes fumures, ou sols de valeur moyenne necessitant des travaux importants d'aménagement
- IIA — Sols fertiles, donnant de bonnes rizières, déjà aménagés ou nécessitant peu de travaux d'aménagement
- IIB — Sols pouvant donner de bonnes rizières, mais travaux d'aménagement importants ou rizières de valeur moyenne
- IIC — Sols pouvant donner des rizières de valeur moyenne, mais travaux d'aménagement importants ou rizières aménagées de médiocre valeur
- V — Sols ne pouvant être cultivés (pente trop forte) mais pouvant porter des cultures arbustives (fruitiers)
- VIIA — Sols ne convenant ni à la culture ni au pâturage, portant déjà des forêts ou des reboisements exploitables, ou pouvant être économiquement reboisés
- VIIB — Sols ne convenant ni à la culture ni au pâturage, de peu d'interêt pour le reboisement à laisser se réembroussailler naturellement

VEGETATION

- Terres sous cultures
- Cultures sèches (manioc, arachide) jachères à Cynodon dactylon Pers.
- Cultures (rizières ou cultures vivrières sur bas de pente) jachères à Digitaria Humberti A. Camus
- Cultures sporadiques dans complexe de végétation à Phragmites mauritianus Kunth., Cyperus latifolius Poir.
- Marais à Cyperus madagascariensis Roem. et Schult. (zozoro)
- Prairie marécageuse à Cyperus latifolius Poir. et Digitaria Humberti A. Camus
- Végétation post-culturale à Cynodon dactylon Pers. et Digitaria Humberti A. Camus
- Pseudo steppe à Aristida multicaulis Bak. et Hyparrhenia rufa Stapf.
- Reboisement en Eucalyptus
- Plantation de fruitiers aux abords de villages

Reproduction du Service Géographique de Madagascar 1958

02542

P. Raoilinjatovo