



LEGENDE

CLASSES DE SOL

- IC Bons sols de culture, pas de travaux anti-érosifs, déjà mis en valeur ou mis en valeur facile
- IIA Sols fertiles, donnant de bonnes rizières, déjà aménagées, ou nécessitant peu de travaux d'aménagement
- IIB Sols pouvant donner de bonnes rizières, mais travaux d'aménagements importants, ou rizières de valeur moyenne
- IIC Sol. pouvant donner des rizières de valeur moyenne, mais travaux d'aménagement important, ou rizières aménagées de médiocre valeur
- IIIB Sols de cultures sèches de fertilité médiocre. Nécessitant les mêmes traitements que les précédents ou sols de valeur moyennes, mais travaux d'aménagement importants
- VIA Pâturage de bonne valeur à l'état naturel, bonne couverture du sol par des graminées bonnes fourragères
- VIIA Sols ne convenant ni à la culture ni au pâturage, portant déjà des forêts ou des reboisements exploitables, ou pouvant être économiquement reboisés
- VIIB Sols ne convenant ni à la culture ni au pâturage, de peu d'intérêt pour le reboisement, à laisser se reboiser naturellement

- Terres sous cultures
- Cultures sèches (manioc, arachide) jachères à Cynodon dactylon Pers.
- Cultures (rizières ou cultures vivrières sur bas de pente) jachères à Digitaria Humberti A. Camus
- Cultures (rizières) jachères à Leersia hexandra Sw
- Marais à Cyperus madagascariensis Roem et Schult (zozoro)
- Marais à Cyperus latifolius Poir (Herana)
- Prairie marécageuse à Cyperus latifolius Poir et Digitaria Humberti A. Camus
- Prairie marécageuse à Cyperus latifolius Poir et Leersia hexandra Sw
- Prairie marécageuse à Digitaria Humberti A. Camus et Leersia hexandra Sw
- Prairie marécageuse à Aristida similis Steud et Digitaria Humberti A. Camus

VEGETATION

- Peuplement de Phragmites mauritianus Kunth (Dararata)
- Zone basse à topographie mamelonée, végétation complexe : Cynodon dactylon Pers., Digitaria Humberti A. Camus, Leersia hexandra Sw, etc.
- Savane herbueuse à Hyparrhenia rufa Stapf et Heteropogon contortus Beauv
- Végétation post-culturelle à Cynodon dactylon Pers. et Digitaria Humberti A. Camus
- Pseudo-Steppe à Aristida multicaulis Bak
- Pseudo-Steppe à Aristida multicaulis Bak et Hyparrhenia rufa Stapf
- Pseudo-Steppe à Aristida multicaulis Bak, et Pteridium aquilinum Kunth
- Reboisement en Eucalyptus
- Vestige de reboisement secondaire en bordure de Bas fond (Haron-ga madagascariensis Choisy; Solanum auriculatum Ait.; Trema orientalis Bl.)
- Vestige de forêt marécageuse de bas fond