



CLASSES DE SOL

- IC** Sols une fois aménagés, demandant peu de travaux antérosifs, mais potentiel de fertilité bas, fortes fumures; ou sols de valeur moyenne nécessitant des travaux importants d'aménagement
- IIA** Sols fertiles, donnant de bonnes rizières, déjà aménagés, ou nécessitant peu de travaux d'aménagement
- IIB** Sols pouvant donner de bonnes rizières, mais travaux d'aménagement importants ou rizières de valeur moyenne
- IIC** Sols pouvant donner des rizières de valeur moyenne, mais travaux d'aménagement importants, ou rizières aménagées de médiocre valeur
- VIIA** Sols ne convenant ni à la culture, ni au pâturage, portant déjà des forêts ou des reboisements exploitables, ou pouvant être économiquement reboisés

LEGENDE

- Terres sous cultures
- Cultures (rizières ou cultures vivrières sur bas de pente) jachères à Digitaria Humberti A. Camus
- Cultures, jachères à Digitaria Humberti A. Camus et Cynodon dactylon Pers
- Cultures (rizières) jachères à Leersia hexandra Sw.
- Cultures sporadiques dans végétation à base de Cyperus latifolius Poir
- Marais à Cyperus madagascariensis Roem et Schult (zozoro)
- Prairie à Digitaria Humberti A. Camus

VEGETATION

- Prairie marécageuse à Cyperus latifolius Poir et Leersia hexandra Sw
- Peuplement de Phragmites mauritianus Kunth (Bararata)
- Taches de Oryza perennis Moench, ssp. madagascariensis, A. Chev
- Prairie marécageuse à Cyperus latifolius Poir et Oryza perennis Moench ssp. madagascariensis, A. Chev
- Prairie marécageuse à Echinochloa pyramidalis Hitch et Chase, Leersia hexandra Sw, Eleocharis plantaginea R. Br
- Savane herbacée à Hyparrhenia rufa Stapf et Heteropogon contortus Beauv
- Végétation post-culturelle à Cynodon dactylon Pers et Digitaria Humberti A. Camus