



CLASSES DE SOL

I a	Terrain cultivable de façon continue sans précautions spéciales. Rotation, fumure.
II	Alluvions ou sols de marais convenant à la riziculture ou au pâturage.
III a	Terrain cultivable mais de façon discontinue. Mesures anti-érosives nécessaires. Cultures en bandes alternées, Terrasses. Maintien de la fertilité par utilisation régulière de la fumure assolement avec plantes améliorantes, prairies temporaires.
III b	Terrain cultivable dans les mêmes conditions que ceux de la classe précédente, mais, plus délicats car déjà dégradés par les cultures et un emploi abusif. Fortes fumures nécessaires.
VI a	Pâturage naturel sur sol peu dégradé. Exploitation méthodique possible. Foin, rotation des parcelles utilisés.
VI b	Zone pastorale mais déjà dégradée, a le plus souvent besoin de repos. Reboiser les parties atteintes et les plus dangereusement exposées.
VII	Sol trop escarpé, trop érodé, à réembroussailler ou reboiser quand il est possible.

LEGENDE

	Végétation en évolution dans marais drainé. <i>Cyperus latifolius</i> (Herana) <i>Cyperus madagascariensis</i> (zozoro) passant à une prairie à base de graminées et cyperacées rases non encore stabilisée.
o+o+	Cultures et jachères à <i>Cynodon dactylon</i> (Chiendent, Fandrotrarana) sur rizières comme en zone sèche.
v+v	Prairie à <i>Aristida similis</i> et <i>Digitaria Humberti</i> (Fandroahy).
o o	Prairie de bas fond à <i>Trichopteryx dregeana</i> .
o o	Prairie inondée à <i>Leersia hexandra</i> (Tsiry, Vilona).
+o+	Jachère sur rizière à <i>Leersia hexandra</i> .
s s	Prairie à <i>Pycnus Mundtii</i> .

VEGETATION

o q	Prairie à <i>Imperata cylindrica</i> (Tenina) avec <i>Hypparrhenia rufa</i> (Vero) et <i>Heteropogon contortus</i> (Danga) où <i>Imperata cylindrica</i> est le plus souvent dominant.
vi vi	Prairie à <i>Aristida multicaulis</i> (Horona) avec <i>Hypparrhenia rufa</i> (Vero) et <i>Heteropogon contortus</i> (Danga) l' <i>Aristida</i> est le plus souvent dominant.
vl vl	Prairie caractérisée par la présence d' <i>Aristida multicaulis</i> et de <i>Pteris aquilinum</i> (Fougère).
ol ol	Prairie caractérisée par la présence de <i>Imperata cylindrica</i> (Tenina) et de <i>Pteris aquilinum</i> (Fougère).
vo vo	Prairie à dominance de l' <i>Aristida multicaulis</i> et présence de l' <i>Imperata cylindrica</i> .
o o+	Prairie avec <i>Imperata cylindrica</i> et <i>Digitaria Humberti</i> .
▨	Vestiges de forêt naturelle.
▨	Reboisement en <i>Eucalyptus</i> .