

USO ACTUAL DEL SUELO



INSTITUTO GEOGRAFICO
"AGUSTIN CODAZZI"




OFFICE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
ET TECHNIQUE OUTRE-MER

PROYECTO IGAC-ORSTOM

ESTUDIO REGIONAL INTEGRADO DEL ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE

ESCALA 1:200.000



USO ACTUAL DEL SUELO

CONVENCIONES

DOMINANTE VEGETACION NATURAL	
	Páramo
	Pantanos
	Rastrojos y gramíneas sin uso
	Arbustos
	Arboles
	Reforestación

DOMINANTE PASTOS	
	Páramo utilizado
	Pasto azul <i>Poa pratensis, Dactylis glomerata</i>
	Pasto oloroso <i>Anthoxanthum odoratum</i>
	Kikuyo <i>Pennisetum clandestinum</i>
	Pastos mejorados: Raigras <i>Lolium spp</i>
	Pastos mejorados: Imperial, Angleton y Pangola <i>Axonopus scoparius, Dichanthium aristatum, Digitaria decumbens</i>
	Gordura y Puntero <i>Melinis minutiflora, Hyparrhenia rufa</i>

DOMINANTE CULTIVOS	
	Cebada, Trigo <i>Hordeum vulgare, Triticum aestivum</i>
	Papa <i>Solanum tuberosum</i>
	Zanahoria <i>Daucus Carota</i>
	Cebolla <i>Allium fistulosum</i>
	Arveja <i>Pisum sativum</i>
	Haba <i>Vicia Faba</i>
	Tomate <i>Lycopersicon esculentum</i>
	Frijol <i>Phaseolus spp</i>
	Hortalizas
	Maíz <i>Zea Mays</i>
	Sorgo <i>Sorghum vulgare</i>
	Algodón <i>Gossypium spp</i>
	Café <i>Coffea arabica</i>
	Caña de Azúcar <i>Saccharum officinarum</i>
	Yuca <i>Mahinot spp</i>
	Arracacha <i>Arracacia xanthorrhiza</i>
	Fique <i>Agave spp</i>

DOMINANTE FRUTALES	
	Manzano, Pera, Durazno, Fresa, Curuba <i>Malus spp, Pyrus communis, Prunus spp, Fragaria sp, Passiflora spp</i>
	Mora <i>Rubus spp</i>
	Plátano <i>Musa spp</i>
	Guayaba <i>Psidium spp</i>
	Maracuyá <i>Passiflora edulis</i>
	Mango <i>Mangifera indica</i>
	Tomate de árbol <i>Cyphomandra betacea</i>
	Cítricos <i>Citrus spp</i>
	Fruales varios

DOMINANTE USO NO AGRICOLA	
	Canteras
	Minas
	Zona industrial
	Zona reservada
	Instituto Colombiano Agropecuario
	Parque nacional
	Urbanización

Zonas frías y muy frías

Zonas templadas y calientes