

LÉGENDE

- 1 Groupement à *Tephrosia platycarpa* et *T. purpurea* sur sols dunaires très drainés (brun-rouge)
 - 2 Groupement à *Monechma* et *Borreria* sur sols dunaires drainés (diors)
 - 3 Groupement à *Diheteropogon Hagerupii* et *Monechma* sur sols dunaires moins drainés (diors)
 - 4 Groupement à *Diheteropogon Hagerupii* et *Zornia* sur sols sablo-argileux drainés (ferrugineux tropicaux)
 - 5 Groupement à *Diheteropogon Hagerupii* et *Andropogon pseudapricus* sur sols sablo-argileux mal drainés (ferrugineux tropicaux à action d'hydromorphie)
 - 6 Groupements des coupoles calcaires (en mosaïque de petites taches parmi les autres groupements) à *Aristida adscensionis* et à *Aristida funiculata*
 - 7 Groupements des bas-fonds humides boisés et mares temporaires.
- FACIÉS DE DÉGRADATION
- 4^h Groupement à *Zornia glochidiata*
 - 5^h Groupement à *Zornia* et *Schoenefeldia*
 - 8 Végétation très dégradée rudérale nitrophile
- Zones bâties

N. B. Les couleurs foncées à composante bleue (3, 4 et 5) correspondent aux groupements à strate de Graminées hautes (*Diheteropogon*, *Andropogon*). Ce sont les pâturages les plus productifs en tonnage.

Les points bleus correspondent aux deux faciés dégradés à *Zornia*, qui constituent les pâturages de meilleure qualité.

- Clôture avec pare-feux
- Piste ou pare-feux sans clôture
- o 24 Emplacement de relevé
- (A) Emplacement d'essai

RÉFÉRENCES : Couverture aérienne 1 : 50.000 I.C.N. Mission ND 28 XXI

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
CENTRE DE RECHERCHES ZOOTECHNIQUES DE DAHRA-DJOLOFF
CARTE DE LA VÉGÉTATION

DRESSÉE PAR J. RAYNAL

ÉCHELLE : 1/20.000

