SÉDIMENTOLOGIE : SUD-OUEST DU LAGON

CLASSES GRANULOMÉTRIQUES

DÉBRIS — SABLES ET GRAVIERS — LUTITES

20 mm — 0,063 mm

DIRECTIONS DU VENT

moyenne, de 1951 à 1965, enregistrée à NOUMÉA par le Service Météorologique de Nouméa



l'équidistance des isobathes est de 10 mètres.

1 Récif corallien immergé (barrière, isolé, frangeant)
4 Débris coralliens abondants (supérieur à 25 % de l'échantillon)
5 Débris coralliens peu abondants (inférieur à 25 % de l'échantillon)
6 Sables très graveleux (graviers supérieurs à 20 % dans la fraction sablo-graveleuse)
7 Sables peu graveleux (graviers inférieurs à 20 % dans la fraction sablo-graveleuse)
8 Lutites abondantes (supérieures à 25 % de l'échantillon)
9 Lutites peu abondantes (inférieures à 25 % de l'échantillon)
10 Teneur en carbonate de calcium supérieure à 50 % de l'échantillon
11 Teneur en carbonate de calcium inférieure à 50 % de l'échantillon

Echelle 1 : 200 000

0 — 10 — 20 km

LE COMPLEXE RÉCIFAL

1 Récif corallien immergé (barrière, isolé, frangeant)
2 Lagon
3 Récif corallien émergé (frangeant soulevé, îlot, île)

0 — 100 km

sédimentologie : zone présentée

© O.R.S.T.O.M. 1981
Carte établie par F. DUGAS et J.P. DEBENAY - ORSTOM - 1979