## LÉGENDE DES CARTES PÉDOLOGIQUES DU PAYSANNAT DE KEMBÉ (Planches III-IV-V-VI-VII-VIII et IX) GROUPE DES SOLS LATÉRITIQUES Sous-groupe des sols rouges latéritiques de plateau (VIII-31-1) (Famille: Roche mère, argilite) Série Kuangba (un seul horizon humifère de 15 à 30cm. de profondeur) Série Di (2 horizons humifères: le premier bien marqué Dà 15 cm. le second rudimentaire, structure nuciforme 15 à 40 cm.) Sous-groupe des sols beiges latéritiques de pente (VIII-31-2) Série Banga (lessivage de surface) GROUPE DES SOLS HYDROMORPHES À MOUVEMENT OBLIQUE DE NAPPE Sous-groupe des sols à carapace de nappe de vallée (IX-43-3) (Famille: alluvions de la Kotto) Série de la Kotto GROUPE DES SOLS HYDROMORPHES À ENGORGEMENT TEMPORAIRE DE PROFONDEUR Sol gris latéritique GROUPE DES SOLS HYDROMORPHES À ENGORGEMENT SEMI-PERMANENT DE SURFACE GROUPE DES SOLS DE PENTE FAIBLEMENT LATERITIQUES Sous-groupe des sols faiblement lateritiques lessivés (VIII-30-2) Série Kembé Série Kéma (horizon superficiel sableux enlevé par l'érosion en totalité ou en partie) GROUPE DES SOLS ÉVOLUES SUR PLACE APRÈS UNE ACTION MÉCANIQUE IMPORTANTE Dalle ou cuirasse latéritique Parpaings latéritiques Carapace ou cuirasse en voie de désagrégation Gravillons lateritiques TYPES ..... Type sablo-arqileux Type argileux Type sableux Type argilo-sableux = Route Layon Profilage à 50 cm. \_\_\_ Piste Profilage à 2m. Limite Forêt-Savane Prélèvement d'échantillons Limite palmeraie de village

