

# CONGO PHYTOGÉOGRAPHIE

ECHELLE : 1 : 2 000 000



## LÉGENDE

### FORMATIONS BASSES HYGROPHILES OU AQUATIQUES

- Prairie flottante
- Papyrusaie
- Marais et steppes marécageuses

### FORMATIONS ARBORESCENTES HAUTES FERMÉES

- Forêt inondée
- Forêt ombrophile équatoriale
- Forêt littorale
- Forêt ombrophile claire
- Forêt mésophile

### FORMATIONS HERBEUSES HAUTES FERMÉES

- Savane à Hyparrhenia forme sans Hymenocardia
- Savane à Hyparrhenia forme avec Hymenocardia


### FORMATIONS HERBEUSES HAUTES OUVERTES

- Savane à Aristida forme à Loudetia
- Savane à Aristida forme à Pobeguinea
- Savane à Aristida forme typique
- Savane à Loudetia demeusii
- Savane à Trachypogon et Hyparrhenia
- Savane à Trachypogon forme appauvrie
- Savane à Andropogon

### FORMATIONS HERBEUSES BASSES OUVERTES

- Steppes loussékés
- Steppes littorales

Les baguettes indiquent la coexistence de deux types de végétation dont l'importance relative est approximativement traduite par l'épaisseur variable de ces baguettes



### Sources

Sud du Congo : J. KOECHLIN : diverses publications et  
 "La végétation des savanes dans le sud... du Congo"  
 (carte : Esquisse de la végétation dans le sud du Congo).  
 Centre : B. DESCOINGS : rapports et esquisses cartographiques inédits.  
 Nord : B. ROLLET : carte des types de végétation de la cuvette congolaise.

05852