



- FORMATIONS LITTORALES HALOPHILES ET PSAMMOPHILES**
- Plage sableuse
  - Mangrove (palétuviers blancs *Avicennia* ou palétuviers rouges *Rhizophora*)
  - jeune
  - âgée ou décadente
  - morte
- FORMATIONS BASSES, HERBACÉES, ARBUSTIVES OU PEU ARBORÉES DE L'INTÉRIEUR**
- Marécage à végétation herbacée, savane marécageuse
  - Marécage à végétation herbacée et plus ou moins arborée: savane à «pruniers»
  - Savane sèche ou moyennement humide
  - Végétation saxicole basse, xérique et discontinue sur inselberg ou îlot rocheux
- FORÊT DENSE, ÉQUATORIALE OMBROPHILE, SEMPERVERTE**
- Forêt fréquemment inondable et marécageuse
  - Forêt de plaine et de pente douce, bien drainée, sur sol argileux
  - Forêt sur cuirasse latéritique (riche en lianes) et d'aspect dégradé
  - Forêt à légère tendance xérique, sur sables blancs et anciens cordons littoraux
- FORMATIONS D'ORIGINE ANTHROPIQUE**
- Forêt secondaire de plaine
  - Forêt marécageuse secondaire
  - Végétation secondaire très dégradée
  - Culture de la canne à sucre

Echelle 1/350 000 0 3,5 7 10,5 14 km

VÉGÉTATION : PLAINES CÔTIÈRES

Carte établie par Jean-Jacques de GRANVILLE