

APTITUDES CULTURALES ET FORESTIÈRES DES SOLS

D CÔTE-D'IVOIRE SUB-SUDANAISE

Secteur sub-soudanais et soudanais
Pluviométrie annuelle comprise entre 1000 et 1600mm
1 saison des pluies

CULTURES VIVRIÈRES mil_igname_mais_riz irrigué_riz pluvial
CULTURES INDUSTRIELLES coton_canne à sucre_riz irrigué
ARBORICULTURE FRUITIÈRE manguiier_anacardier_agrumes
REBOISEMENT PROTECTION DES SOLS teck_gmelina

C CÔTE-D'IVOIRE PRÉFORESTIÈRE

Secteur mésophile et Sub-soudanais
Pluviométrie annuelle comprise entre 1000 et 1600mm
2 saisons des pluies

CULTURES VIVRIÈRES igname_mais_riz pluvial
CULTURES INDUSTRIELLES coton_canne à sucre
ARBORICULTURE FRUITIÈRE avocatier_agrumes_anacardier
REBOISEMENT teck

B MOYENNE CÔTE-D'IVOIRE FORESTIÈRE






Secteur mésophile
Pluviométrie annuelle comprise entre 1200 et 1600mm
2 saisons des pluies

CULTURES VIVRIÈRES igname_manioc_riz pluvial_mais
CULTURES ARBUSTIVES caféier_cacaoyer
REBOISEMENT sipo_teck

A BASSE CÔTE-D'IVOIRE FORESTIÈRE

Secteur ombrophile
Pluviométrie annuelle plus de 1600 mm
2 saisons des pluies

CULTURES VIVRIÈRES manioc_riz pluvial
CULTURES INDUSTRIELLES palmier à huile_hévéa_ananas_banancier
REBOISEMENT acajou_niangon_framiré_fraké_okoumé

-  Propriétés physiques bonnes
sols profonds ou peu gravillonnaires
-  Propriétés physiques médiocres à moyennes
sols gravillonnaires
-  Propriétés physiques médiocres à moyennes
relief accidenté danger d'érosion
-  Propriétés physiques médiocres à mauvaises
sols sableux danger d'érosion
-  Propriétés physiques médiocres
sols indurés peu profonds

